

# **NEUROLOGIA CLINICA.**

# **SENSIBILITATEA.**

*Prof. M. Gavriliuc,*

*Department of Neurology, Medical  
and Pharmaceutical Nicolae  
Testemitsanu State University,  
Republic of Moldova*

# **SENSIBILITATEA: clasificare**

## **1. SUPERFICIALĂ (exteroreceptori):**

- termică (cald și rece),
- tactilă,
- algică.

## **2. PROFUNDĂ (proprioreceptori):**


- simtul de vibratiune,
- simtul mioartrocinetic,
- simtul de presiune.

## **3. COMPLEXĂ:**


- simtul de localizare,
- simtul de discriminare,
- grafestezia,
- stereognozia.

# **RECEPTORII: clasificare histologică**


**corpusculii Meissner – tactilitatea**



**discurile Merkel – presiunea**




**terminațiunile Ruffini - cald**




# **RECEPTORII: clasificare histologică**


**bulpii Krause – rece**



**corpusculii Vater-Pacini – vibratiunea**





**terminații nervoase „libere” - durerea**






# Calea sensibilitatii superficiale

## (durerea si simtul termic)





# Calea Sensibilitatii Superficiiale

## Analizatorul Cortical






# Calea Sensibilitatii Profunde

(simtul de vibratiune, mioartrocinetic etc.)



# Calea Sensibilitatii Profunde

## Analizatorul Cortical



# Calea Sensibilitatii

## Rezumat


Lant din 3 neuroni

Corpul neuronului 1 – ganglionul intervertebral

Incrucisarea – dupa corpul neuronului 2

Corpul neuronului 3 – tuberculul optic

Analizatorul cortical – circumvolutia postcentrala



# **EXAMENUL CLINIC AL SENSIBILITATII**

**Axiome:**

1. Pacientul închide ochii
2. Excitatia se aplica pe tegumente

**Reguli:**

1. Cranial - caudal
2. Simetric
3. Extremitati: proximal – distal
4. Extremitati: pe perimetru

**DEMONSTREZA – TESTEAZA - CONTROLEAZA**

# **DEREGLAREA SENSIBILITATII**

**Feluri (simptome):**

**Hipoestezie** (diminuarea senzatiei – termice, algice, etc.)

**Anestezie** (pierderea completă a sensibilității);  
palanestezie – pierderea simtului de vibratiune.

**Disestezie**

**Hiperestezie**

**Hiperpatie** (durere severă sau de calitate neplăcută)




**Parestezie** (amortire, înghetare, frigere, etc.)

# DEREGLAREA SENSIBILITATII

## TIPURI (sindroame):

### I. Periferic

- mononeural
- multineural
- polineural
- plexal




# **DEREGLAREA SENSIBILITATII**

## **TIPURI:**

### **II. Segmentar (dermatomer)**

- **ganglionar** (+ eruptii Herpes Zoster)
- **radicular** (+ semne de elongatie)
- „coarne posterioare” (disociat)
- **comisural** (siringomielic – disociat „scurtă” sau „semiscurtă”)



# **ERUPTII de HERPES ZOSTER**




# **DEREGLAREA SENSIBILITATII**

## **TIPURI:**

### **III. Conductiv (prezenta nivelului de afectare)**

- cordoane posterioare (ataxie senzitivă)
- sindromul Brown-Sequard (semisectiune transversă)
- sectiune transversă completă (paraplegic)
- truncular (hemi + altern)
- talamic (hemi + dureri talamice)
- capsular (sindromul celor 3 sau 4 hemi)



# **DEREGLAREA SENSIBILITATII**

**TIPURI:**

IV. Cortical

- mono
- hemi

V. Functional (isteric)

# **TULBURARI DE SENSIBILITATE**


## **SEMNIFICATIE DE DIAGNOSTIC**

- **Afectarea unui singur nerv** — tip periferic, varianta mononeurală. *Cauză frecventă:* neuropatie de tip tunel. Diabet zaharat, artrită reumatoidă, hipotiroidism.
- **Afectarea multiplă de nervi:** mononeuritis multiplex – varianta multineurală. *Cauză frecventă:* vasculită, în cadrul unor neuropatii difuze.
- 
- **Polineuropatii – tip periferic, varianta polineurală.** *Cauză frecventă:* diabet zaharat, alcoolism, carență de vitamina B12, medicamentoase (de ex. vincristina); frecvent neidentificate; *cauze rare:* sindromul Guillain-Barre, neuropatii ereditare (de ex. maladia Charcot-Marie-Tooth), vasculite, alte carențe de vitamine.

# TULBURARI DE SENSIBILITATE

## SEMNIFICATIE DE DIAGNOSTIC

-**Suferintă radiculară** — tip segmentar, varianta radiculară. Cauză frecventă: hernie de disc intervertebral; Cauze rare: tumori (de ex. neurofibroma).




# TULBURARI DE SENSIBILITATE

## SEMNIFICATIE DE DIAGNOSTIC

### - Leziune medulară

- Tip conductiv, varianta

**paraplegică.** *Cauze frecvente:* traume, tumori vertebrale, spondilită cervicală, mielita transversă, scleroza multiplă; *Cauze rare:* tumori intraspinale (de ex. meningioamele), abcese spinale, sindromul arterei spinale anterioare.




# TULBURARI DE SENSIBILITATE

## SEMNIFICATIE DE DIAGNOSTIC

### Leziune medulară


- Tip segmentar, varianta comisurală (rar) — Cauze: siringomielia, hematomielie post-traumatică.
- Tip conductiv, varianta cordoane posterioare (rar) — carentă de vit B12 și tabes dorsalis, sindromul artrelor spinale posterioare.



# TULBURARI DE SENSIBILITATE

## SEMNIFICATIE DE DIAGNOSTIC


- **Lezare de trunchi cerebral (rar)**
- **Cauze frecvente:**  
**demilinizare, AVC,**
- **Cauze rare:**  
**tumori.**




# TULBURARI DE SENSIBILITATE

## SEMNIFICATIE DE DIAGNOSTIC

- **Leziune talamică sau corticală – tip conductiv, varianta talamică sau cortical, varianta mono- sau hemi-. Cauze frecvente:** AVC (trombotic, embolic sau hemoragic), tumori cerebrale, scleroza multiplă, traumatismul.
- **Neuroza isterică – tip functional.**



# NEUROLOGIA



"Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information on it."  
-- *Samuel Johnson*

